

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-4-63 205922
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

BULLETIN N° 31 d'AVRIL 1963

8 AVRIL 1963

V I G N E

INFORMATIONS

Acariose de la vigne

En 1962 de très nombreux foyers d'acariose, situés principalement dans les jeunes plantations, ont été observés dans le vignoble champenois.

L'acariose est active dès après le débourrement : à cette période la croissance semble arrêtée et les pousses, à entre noeuds courts, portent des feuilles gaufrées et petites. Les acariens responsables de ces dégâts passent l'hiver sous les écorces des vieux bois ou les écailles des bourgeons.

Les essais les plus récents ont prouvé que le procédé de lutte le plus efficace consiste en l'application de traitements de prédébourrement, effectués juste avant le débourrement (stade B) en pulvérisant abondamment :

- une bouillie sulfocalcique
- des soufres micronisés
- un oléoparathion ou oléomalathion ou oléodiazinon si toutefois les températures sont assez élevées pour leur conférer une pleine efficacité.

Cochenille

Contrairement à ce qu'ont pu penser certains exploitants, ces insectes n'ont pas souffert des froids de l'hiver. Les huiles insecticides appliquées juste avant le débourrement font preuve d'une efficacité certaine contre ces parasites.

71.5.9

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENT

Tavelures du pommier et du poirier

Certaines variétés de poiriers ayant atteint le stade C3, il serait bon d'effectuer le premier traitement. Les produits cupriques sont conseillés à la dose de 0,5 % de cuivre métal.

Pour les pommiers, il est nécessaire d'attendre un avis ultérieur.

INFORMATIONS

Oïdium du pommier

Continuer à éliminer les pousses oïdiées au cours de la taille.

Acarieus - Pucerons

Si les traitements d'hiver n'ont pas été effectués, il serait bon d'appliquer quelques jours avant le débourrement un traitement à l'oléoparathion, oléomalathion ou oléodiazinon.

GRANDE CULTURE

INFORMATION

Désherbage sélectif des céréales

Jusqu'à présent les conditions climatiques ont été peu favorables à une reprise active de la végétation des céréales qui ont résisté au gel.

Il est contre-indiqué d'appliquer un traitement aux colorants nitrés sur des plantes qui se trouvent encore en état nettement déficient.

Cette pulvérisation herbicide ne devra intervenir que sur des cultures présentant une végétation normale.

Il est préférable de différer un traitement et d'intervenir à dose plus forte sur mauvaises herbes sensiblement plus avancées que de le réaliser à dose moindre sur des cultures de céréales n'ayant pas encore "récupéré".

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopsanitaire de REIMS

Imprimerie de la Station de Champagne - Directeur-Gérant : L. BOUYX